

Prostaforton® uno

285 mg Filmtabletten

Für erwachsene Männer

Wirkstoff: Brennnesselwurzel-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Prostaforton uno jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Prostaforton uno und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Prostaforton uno beachten?
3. Wie ist Prostaforton uno einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Prostaforton uno aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1 Was ist Prostaforton uno und wofür wird es angewendet?

Prostaforton uno ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Prostata-Erkrankungen.

Prostaforton uno wird angewendet bei Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Vergrößerung der Prostata (Miktionsbeschwerden bei benigner Prostatahyperplasie Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck).

Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Prostaforton uno beachten?

Prostaforton uno darf nicht eingenommen werden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Zubereitungen aus Brennnesselwurzel oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Prostaforton uno ist erforderlich

Suchen Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf, da Prostaforton uno die Vergrößerung der Prostata nicht behebt.

Bei Einnahme von Prostaforton uno mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen zwischen Prostaforton uno und anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Bei Einnahme von Prostaforton uno zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Hinweis für Diabetiker

1 Filmtablette enthält weniger als 0,01 BE.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Prostaforton uno

Prostaforton uno enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Prostaforton uno daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3 Wie ist Prostaforton uno einzunehmen?

Nehmen Sie Prostaforton uno immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

1-mal täglich 1 Filmtablette

Nehmen Sie die Filmtabletten jeweils zur gleichen Tageszeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit nach einer Mahlzeit ein.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht beschränkt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Abschnitt 1.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Prostaforton uno zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Prostaforton uno eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung von Prostaforton uno kann es zum verstärkten Auftreten der Nebenwirkungen kommen (siehe Abschnitt 4). In diesem Fall sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme von Prostaforton uno vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Prostaforton uno Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen

Sehr selten: kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie Prostaforton uno nicht weiter ein und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Gelegentlich treten leichte Magen-Darm-Beschwerden auf.

Selten werden Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht) beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5 Wie ist Prostaforton uno aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. der Blisterpackung nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6 Weitere Informationen

Was Prostaforton uno enthält

Der Wirkstoff ist: Brennnesselwurzel-Trockenextrakt

1 Filmtablette enthält 285 mg Trockenextrakt aus Brennnesselwurzel (15-20:1); Auszugsmittel: Ethanol 80 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogol 4000, Glycerol-Macrogol-400-Docosanoat, hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Titandioxid (E 171), Eisenoxidhydrat (E 172)

Wie Prostaforton uno aussieht und Inhalt der Packung

Ockerfarbene Filmtabletten

Prostaforton uno ist in Packungen mit 60 und 120 Filmtabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2

12277 Berlin

Tel.: +49 30 72082-0

Telefax: +49 30 72082-200

E-Mail: info@kade.de

www.kade.de

Hersteller

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Opelstraße 2

78467 Konstanz

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2017.

46200130, K2180